



## Notes d'officine

Un doute ? Un oubli ?  
Jeter un œil c'est pratique !

# INFECTION PAR LE VIH

144 000 personnes sont infectées en France. **28 800** vivraient avec le virus sans le savoir. 6000 nouvelles contaminations sont estimées en 2011.

**29 %** sont prises en charge au stade SIDA. (*Chiffres de l'INVS Rhône-Alpes 2011*).

**Test rapide d'orientation diagnostique (TROD) :**  
test réactif sur une goutte de sang. Fiable 3 mois après le contage.


**Diagnostic :**  
dosage des anticorps anti-VIH1 et anti-VIH2 ET de l'Ag p24 du VIH-1.

Détection d'une séropositivité au bout de **20 jours**, mais **fiabilité à 6 semaines**.

Médicaments	DCI	Classe pharmaco	Posologie	Moment de prise	Effets indésirables	Interactions
TRUVADA	Ténofovir + Emtricitabine	INTI	1cp/24h	Repas ou collation	Digestifs, rénaux	
KIVEXA	Abacavir + Lamivudine		1cp/24h		Hypersensibilité détectée préalablement par test HLA	
VIRAMUNE 200 ou LP 400	Névirapine	INNTI	200mg/12h ou LP 400mg/24h		Cutanés	Inducteur 3A4
INTELENCE 200	Etravirine		200mg/12h	Après un repas	Cutanés	Inducteur 3A4 faible
ATRIPLA	TRUVADA + Efavirenz	INTI + INNTI	1cp/24h	Juste avant le coucher	Vertiges, dépression	<b>Inducteur 3A4 fort</b>
EVIPLERA	TRUVADA + Rilpivirine		1cp/24h	Repas ou collation	Nausées	
NORVIR 100	Ritonavir	IP, booster pharmacocinétique	Dépend de l'IP associé	Pendant un repas, avec l'autre IP	Digestifs	<b>Inhibiteur 3A4 fort</b> , de la Pgp, des 2D6 et 2C9
PREZISTA 800 ou 600	Darunavir	IP	[800mg + 100mg de Norvir]/24h ou [600mg + 100mg de Norvir]/12h	Pendant un repas, avec le Norvir	Digestifs, cutanés	Inhibiteur 3A4
REYATAZ 300	Atazanavir		300mg et 100mg de Norvir/24h	Pendant un repas, avec le Norvir	Hyperbilirubinémie (oculaire)	Inhibiteur 3A4
KALETRA	Lopinavir + Ritonavir		2 cp/12h	Pendant un repas	Digestifs (diarrhées)	Inhibiteur 3A4
ISENTRESS 400	Raltégravir	Inhibiteur Intégrase	400mg/12h		Digestifs, céphalées	
CELENTRI 150 ou 300	Maraviroc	Inhibiteur d'entrée	<b>150mg/12h</b> si associé à un inhibiteur 3A4 (ex : IP) <b>300mg/12h</b> sans interaction <b>600mg/12h</b> si associé à un inducteur 3A4 (efavirenz)			Substrat 3A4

INTI : Inhibiteur Nucléosidique de la Transcriptase Inverse / INNTI : Inhibiteur Non Nucléosidique de la Transcriptase Inverse / IP : Inhibiteur des Protéases

## EXEMPLES D'ASSOCIATIONS D'ANTIRETROVIRAUX



## REPERER UNE INTERACTION

### Réglette d'interactions d'Actions Traitements et les RCP

Sites internet pour recherche :  
[hiv-druginteractions.org](http://hiv-druginteractions.org) et [hivinsite.ucsf.edu](http://hivinsite.ucsf.edu)

**Molécules sensibles** : le Ritonavir (NORVIR), qui est inhibiteur 3A4 fort, et l'Efavirenz (ATRIPLA ou SUSTIVA), inducteur 3A4.

**Interactions à surveiller** :

Benzodiazépines, macrolides, statines, sulfamides hypoglycémiantes et les Inhibiteurs de la Pompe à Protons :

Diminution respectivement de 40 et 60 % de la biodisponibilité de la Rilpivirine (EDURANT ou EVIPLERA) et du REYATAZ : association contre-indiquée.

### OBSERVANCE

- 1 à 2 oublis de prise par mois : à surveiller.
- 3 oublis par mois ou plus : revoir le prescripteur, examens complémentaires à réaliser ?

➡ Pilulier, rappel/application sur smartphone.

Prises de médicaments à heure fixe.

**6h pour rattraper une prise toutes les 12h**

**12h pour rattraper une prise toutes les 24h.**

### TOLERANCE

Fatigue et troubles digestifs (diarrhées, douleurs, nausées) importants les premiers mois

Sommeil : notamment avec l'Efavirenz (cauchemars, vertiges).

Manifestations cutanées : hydratation cutanée en attendant l'avis du spécialiste. Urgences si réaction massive.

### CONSEILS

Pratique sportive et alimentation équilibrée associées à un suivi biologique des anomalies lipidiques

➡ Limiter la **lipodystrophie** et les troubles métaboliques.

Sevrage tabagique dans la mesure du possible.

Ne pas associer de millepertuis.

Eviter le pamplemousse (12 heures de décalage avec les antirétroviraux).

Vaccins vivants autorisés quand  $CD4 > 200$ .

Supplémentation en vitamine D, voire calcium.

### ACCIDENTS D'EXPOSITION AU SANG

Traitement préventif démarré **idéalement dans les 4 heures** suivant l'accident, et au maximum lors des **48 premières heures**.  
On utilise une trithérapie comme Truvada-Kaletra prescrite sur 3 ou 4 jours. Une nouvelle consultation détermine la poursuite ou non sur **28 jours**.

### DELIVRANCE

La prescription initiale doit être hospitalière par un(e) infectiologue. Elle a une validité de 12 mois : renouvellement autorisé par le médecin traitant.

L'infection par VIH est une ALD 30.

Médicaments vignetés à 100%.

Renouvellement minimum tous les 23 jours.

Où se faire diagnostiquer ? [www.vihservices.fr](http://www.vihservices.fr)  
**Pharmacies hospitalières :**

**Pharmacie Centrale** 04 78 86 33 77

**Edouard Herriot** 04 72 11 03 91

**Croix-Rousse** 04 72 07 19 90

**Pharmacies hospitalières :**

**Pharmacie Centrale** 04 78 86 33 77

**Edouard Herriot** 04 72 11 03 91

**Croix-Rousse** 04 72 07 19 90